

**Czapla modronosa - *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769)**

**Status gatunku:** zalatująca sporadycznie, stwierdzona 5 razy.

Pierwszy raz obserwowana nad 14 V 1975 r. nad Wisłą k. Kępy Bielańskiej (Cieślak 1977). Ponownie po ponad 30 latach 21 V 2007 r. - 1 ad. napotkano nad Jez. Czerniakowskim w Warszawie (L. Snellink, Komisja Faunistyczna 2008). Aż trzy stwierdzenia odnotowano w roku 2020, 9 VI 1 ad. na st. Gutocha (M. Rycak, Komisja Faunistyczna 2021) i tego samego dnia 1 ad. nad Wisłą k. Liszyna (K.i K. Sporczyk, Komisja Faunistyczna 2020) oraz 25 VI – 1 ad. na stawach Cieleśnica (M. Ruszkowski, Komisja Faunistyczna 2021).

Sapalski (1862) ogólnikowo pisze o rzadkich obserwacjach w okresie przelotu, na terenie guberni radomskiej, ponieważ południowa część znajdowała się poza granicami Mazowsza, trudno jednoznacznie określić skąd pochodziły te obserwacje

**Sławomir Chmielewski**

**Streszczenie:** zalatuje sporadycznie, stwierdzona 5 razy.

Literatura:

Cieślak M. 1977. Obserwacje czapli białej (*Egretta alba*) i czapli modronosej (*Ardeola ralloides*) w centralnej Polsce. Not. Orn. 18: 51-52.

Komisja Faunistyczna. 2008. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2007. Not. Orn. 49: 81-115.

Komisja Faunistyczna. 2021. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2020. Ornis Pol. 62: 113-148.

Komisja Faunistyczna. 2022. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 2021. Ornis Pol. 63: .....