

## Instrukcja wypełniania formularza

Jeden formularz jest przeznaczony dla jednego gatunku na danym stanowisku. W przypadku mieszanych kolonii rybitw trzeba wypełnić formularze dla każdego gatunku osobno. Formularz skonstruowano w bardzo prosty sposób, załączono przykład wypełnienia, więc ta krótka instrukcja nie zawiera informacji dotyczących wypełnienia każdej kolumny.

- Należy wpisać koordynaty położenia wykorzystując GPS w terenie, w oparciu o Google Maps lub Geoportal (lub w terenie o ile posiada się GPS),
- Należy dążyć do wykonania dwóch kontroli w każdej kolonii, pierwsza kontrola koniecznie w czerwcu
- **Ważne jest aby wpisywać liczbę osobników obserwowanych w kolonii, a nie liczbę par (oszacowanych przez obserwatora).** Policzenie zaniepokojonych osobników daje najlepsze efekty kiedy obserwator podejdzie do kolonii jak najbliżej, obserwacje z większego dystansu mogą dać zaniżone wyniki. Trzeba pamiętać, że rybitwy mogą niepokoić się (krótco) również kiedy nie mają lęgu, trzeba być więc pewnym statusu ich lęgowości.
- Jeżeli obserwator policzy gniazda to taką informację trzeba podać.
- Należy podać inne gatunki lęgowe w kolonii, przede wszystkim ptaki wodno-błotne
- Bardzo pomocne będą zdjęcia kolonii, więc prosba o 3 zdjęcia dokumentacyjne z różnych stron.

Wypełnione w komputerze formularze należy przysyłać drogą mailową do Artura Goławskiego: [artgo1@uph.edu.pl](mailto:artgo1@uph.edu.pl) oraz Andrzeja Dombrowskiego: [adomb@wp.pl](mailto:adomb@wp.pl) i Sławka Chmielewskiego: [sch6@wp.pl](mailto:sch6@wp.pl)

Wzór wypełnionego formularza

Gatunek <i>Rybitwa białoskrzydła</i>	Miejscowość <i>Klimonty</i>	Szczegółowa lokalizacja <i>1 km na NE od Klimonty</i>	
Koordinat N <i>52 23 12.1</i>	Gmina <i>Mordy</i>	Powiat <i>siedlecki</i>	
Koordinat E <i>22 43 42.7</i>	Imię i nazwisko <i>Artur Goławski</i>	e-mail (telefon) <i>artgo1@uph.edu.pl</i>	
<b>Biotop (zaznaczyć x)</b>	<b>Miejsce gniazdowania (zaznaczyć x)</b>	<b>Inne gatunki w kolonii</b>	<b>Liczba osobników</b>
Stawy hodowlane	Osoka	<i>rybitwa czarna</i>	<i>23 zaniepok.</i>
Starorzecze <input checked="" type="checkbox"/>	Skrzyp	<i>śmieszka</i>	<i>12 zaniepok.</i>
Zalane łąki	Turzyce	<i>zausznik</i>	<i>3 na gniazdach</i>
Zalane turzycowisko	Kożuch z błota	<input checked="" type="checkbox"/> <i>krwawodziób</i>	<i>2 zaniepok.</i>
Inne (opisać jakie)	Inne (opisać jakie)	Uwagi <i>Śmieszki lęgowe w odległości min. 50 m od rybitw białoskrzydłych, rybitwy czarne lęgowe między r. białoskrzydłymi</i>	

Data	Szczegóły obserwacji
<i>06.06.2013</i>	<i>34 zaniepokojone osobniki CHL, widać 4 ptaki wysiadujące na gniazdach</i>
<i>23.06.2013</i>	<i>28 zaniepokojonych ptaków, 2 ptaki z pokarmem</i>